

## Інформація про пацієнта

Прізвище \_\_\_\_\_

Ім'я \_\_\_\_\_

Стать \_\_\_\_\_

Дата народження \_\_\_\_\_

ID пацієнта \_\_\_\_\_

Дата обстеження \_\_\_\_\_

ПІБ лікаря \_\_\_\_\_

### **Первинний діагноз / Показ до обстеження**

Велофарингеальна дисфункція (Гіперназальна вимова)	
Назофарингеальний стеноз	
Вроджені піднебінно-глоткові аномалії	
Набуті піднебінно-глоткові аномалії	
Охриплість голосу	

### **Анамнез хвороби**

Розщілина піднебіння	
Розщілина губи і піднебіння	
Прихована розщілина піднебіння	
Пухлина піднебіння	
Травма піднебіння	

### **Попередні хірургічні**

**втручання** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Генетичний діагноз**

22q11.2DS	
Синдром Стіклера	
Трисомія 21 пари хромосом	

Синдром Ван дер Вуда	
Нейрофіброматоз	
Синдром Нунан	
Неідентифікована генетична аномалія	
Відсутність генетичної патології	
Відсутній	

Інше \_\_\_\_\_

### Результати обстеження

#### Взаємодія пацієнта

Чудова	
Нормальна	
Обмежена	
Слабка	

Інше \_\_\_\_\_

#### Зразок мовлення

Розмова	
Речення	
Читання уривка	
Слова та словосполучення	
Слова	
Словосполучення	
Склади	
Окремі приголосні/голосні	

Інше \_\_\_\_\_

#### Характеристика фонації

З придигом, легкий ступінь	
З придигом, помірний ступінь	
З придигом, важкий ступінь	
З високим тоном	
Хрипла, легкий ступінь	
Хрипла, помірний ступінь	
Хрипла, важкий ступінь	
Нормальна	
Зменшена гучність	

**Резонанс**

Гіпер/гіпоназальний	
Гіперназальний, слабо виражений	
Гіперназальний, посередній	
Гіперназальний, сильно виражений	
Гіпоназальний	
В межах норми	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Результати відео обстеження****Розмір носоглотки**

Глибока	
Вузька	
Неглибока	
Широка	
Широка і глибока	
Нормальна	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Мигдалики**

Збільшені	
Середнього розміру	
Зменшені	
Западають у носоглотку	
Не візуалізуються	
Хірургічно видалені	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Аденоїди**

Мінімальна кількість тканини на/над рівнем закриття	
Мінімальна кількість тканини над рівнем закриття	
Мінімальна кількість тканини на рівні закриття	
Помірна кількість тканини на/над рівнем закриття	

Помірна кількість тканини над рівнем закриття	
Помірна кількість тканини на рівні закриття	
Значна кількість тканини на/над рівнем закриття	
Значна кількість тканини над рівнем закриття	
Значна кількість тканини на рівні закриття	
Хірургічно видалені	

### Каротидна пульсація

Присутня, двостороння	
Присутня, з лівого боку	
Присутня, з правого боку	
Не пальпується	

Інше \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Особливості піднебінно-глоткової рухливості

#### Піднебінно-глоткове закриття

Асиметричне	
Циркулярне	
Коронарне	
Сагітальне	

Інше \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### Участь піднебіння у закритті ... (у %)

\_\_\_\_\_  
 +

#### Участь латеральної стінки у закритті ... (у %)

\_\_\_\_\_ =100 %

#### Приблизний розмір піднебінно-глоткової щілини

Відсутня = 0	
Щільне закриття з утворенням пухирців = 0-1	
Мала = 1-4 мм	
Середня = 5-9 мм	

Велика = 10-15 mm	
-------------------	--

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Закриття піднебінно-глоткового сфінктеру (у %)

\_\_\_\_\_

### Характеристика піднебінно-глоткової рухливості

Сильна	
Нормальна	
Помірна	
Слабка	
Дуже незначна	
Відсутня	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Піднебінно-глоткова рухливість (за часом)

Адекватна	
Відстрочена	
Некоординована	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Коментарі \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Клінічний діагноз і план лікування

### Висновок

Носоглотковий стеноз	
Важка піднебінно-глоткова дисфункція	
Помірна піднебінно-глоткова дисфункція	
Слабка піднебінно-глоткова дисфункція	
Нормальна піднебінно-глоткова функція	

Інше \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## План

Видалення аденоїдів	
Видалення мигдаликів	
Видалення аденоїдів і мигдаликів	
Латеральна відеофлуороскопія	
Подовження піднебіння	
Задній глотковий клапоть (PPF)	
Повторна палатопластика	
Ревізія пластики піднебіння по Фурлову	
Сфінктерна фаринголастика	
Відновлення прихованої розщілини піднебіння	
Видалення мигдаликів та аденоїдів перед хірургічним втручанням	
Робота з логопедом	

Інше \_\_\_\_\_

---